

＜ 1日ドック・半日ドック_オプション検査のご案内＞

① 癌に関する検査

1	婦人科検診	7,700 円	事前予約	超音波検査、子宮頸部細胞診を行い、子宮頸癌、卵巣腫瘍等の婦人科疾患を発見します。
2	子宮体がん検査	5,500 円	事前予約	子宮体部細胞診による子宮体癌スクリーニング検査です。
3	HPV検査 (ヒトパピローマウイルス検査)	7,700 円	事前予約	HPVは子宮頸癌の原因となるウイルスです。HPV検査は細胞診と同様な方法で子宮頸部の細胞を採取し、癌の原因となる危険な型のウイルスに感染しているか調べる検査です。細胞診にHPV検査を加えることで癌の診断の精度が上がると言われています。
4	乳がん検診	5,500 円	事前予約	マンモグラフィ（専用の低圧X線撮影装置）で、乳腺疾患を早期に発見します。妊娠中・授乳中（断乳後6ヶ月未満）、胸部にペースメーカー、豊胸手術を受けている方は受診できません。
5	肺ドック	17,600 円	事前予約	肺癌を早期発見するための検査です。高速CT(MDCT)を用いてミリ単位の病巣を発見します。特に40歳以上のヘビースモーカーや身内に肺癌の多い方にお勧めします。3種の腫瘍マーカーの結果と併せて診断します。
6	ABC検診	4,950 円	当日追加可	ピロリ菌IgG抗体（血液検査）とペプシノゲン検査の陽性・陰性の組み合わせで胃癌発症の危険度を示す簡易検査で、「胃癌リスク検診」とも言われます。
7	大腸内視鏡 ※1	22,000 円	事前予約 (別日にご案内)	内視鏡により大腸癌、ポリープ、炎症等の疾患を診断します。当日の検査は観察のみです。ポリープ等が発見され、切除等の治療が必要な場合は、別日に病院で保険診療となります。※1 前処置の関係で別日となります。
8	直腸診（35歳以上の方）	2,200 円	事前予約	視触診、肛門鏡により、肛門・直腸（一部）の疾患の有無を調べます。 ※1日ドックには含まれております

② 生活習慣、動脈硬化、加齢、感染症に関する検査

1	脳ドック	36,300 円	事前予約	核磁気共鳴装置を用いて「隠れ脳梗塞」等の脳内病変の有無を調べ（MRI検査）、造影剤を用いずに動脈瘤、動脈硬化等の頭部血管病変を発見します（MRA検査）。また頸動脈超音波検査で動脈硬化の初期病変を検出します。
2	運動負荷心電図検査	12,100 円	事前予約	トレッドミルと言われる傾斜のついたベルトの上を歩いて頂き、運動時の心電図を記録するものです。運動に伴う心電図や心拍数・血圧の変化がわかり、安静時心電図ではわかりにくい狭心症や心機能の診断に有用です。
3	動脈硬化検査	3,300 円	当日追加可	左右上下肢の血圧を同時に測定することにより、血管の硬さ（脈波伝播速度）や下肢の動脈硬化（ABI）を検出します。特に、足のシビレに悩む方や歩行時に下肢が痛む方にお勧めします。
4	内臓脂肪検査	5,500 円	事前予約	臍部横断面一枚のCT写真を用いて内臓脂肪面積を測定します。腹囲のみの測定と異なり、皮下脂肪と内臓脂肪を明確に区別できます。腹部肥満の気になる方、ダイエットや運動の効果を確かめたい方にお勧めします。
5	骨密度	4,950 円	当日追加可	二重エネルギーX線吸収測定法（DXA）により大腿骨および腰椎の骨塩量を測り、骨密度を算出します。骨粗鬆症の早期発見に用いられます。健康診断報告書の骨密度の数字は大腿骨のデータを使用しています。
6	睡眠時無呼吸検査 (簡易)	9,900 円	事前予約	睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査です。睡眠中の呼吸状態、脈拍、動脈血酸素飽和度（SpO2）、いびきの回数を測定します。ご希望日にご自宅に検査機器一式をお送りし、手順書に従って行っていただく検査です。
7	BNP (NT-proBNP)	2,200 円	当日追加可	心臓から出るホルモン（ナトリウム利尿ペプチド）で、心臓に負担がかかっていると血液中の濃度が上昇します。そのため、心臓の機能のチェックに用いられます。息切れや動悸が気になる方、心臓が大きいといわれた方に特にお勧めします。
8	HIV抗体	3,300 円	当日追加可	AIDS（エイズ）に感染しているかどうかを検出します。感染の機会があってから6-8週以後、陽性になります。

③ その他の検査

1	甲状腺機能検査	3,850 円	当日追加可	甲状腺は頸の前面下部にある内分泌器官で甲状腺ホルモンを分泌します。過剰になるとバセドウ病、不足すると機能低下症になります。頸のハレ、原因不明のやせ、眼球突出、心不全、認知症の原因になることがあります。
2	花粉症検査	7,700 円	当日追加可	スギ、ヒノキ、ハウスダストのアレルギーの有無を血液中の特異抗体を測定して調べます。
3	内視鏡時鎮静剤	5,500 円	事前予約制	胃内視鏡・大腸内視鏡時に使用する鎮静剤